

## Informatie over axiale SpA <sup>[1]</sup>



Axiale spondyloartritis (axiale SpA) is een ontstekingsziekte waarbij de gewrichten van de wervelkolom en andere delen van het lichaam pijnlijk en stijf zijn.

Er zijn twee verschillende vormen van axiale SpA: niet-röntgenologische axiale SpA (nr-axSpA) en röntgenologische axiale SpA (r-axSpA), ook wel bekend als spondylitis ankylopoetica en/of ziekte van Bechterew. Bij beide vormen kunnen vergelijkbare klachten en ontstekingsverschijnselen optreden, maar bij nr-axSpA zijn er (nog) geen afwijkingen op röntgenfoto's te zien aan de gewrichten tussen het bekken en de wervelkolom. Dit in tegenstelling tot r-axSpA, waar deze afwijkingen wel zijn te zien. In het vervolg zullen wij voor het gemak spreken van "axiale SpA" of van "de ziekte".

Axiale SpA begint meestal in de gewrichten tussen het bekken en de wervelkolom, maar kan zich uitbreiden tot aan de nekwerfels. Sommige mensen ontwikkelen ook symptomen in andere gewrichten dan de wervelkolom. De symptomen ontstaan en verergeren sluipend, meestal gedurende maanden of jaren en kunnen variëren in ernst in de loop van tijd.

Axiale SpA komt bij ongeveer 1 op de 200 mensen voor, en komt binnen sommige families vaker voor. De aandoening begint meestal tussen het 15e en 35e levensjaar. Evenveel mannen als vrouwen hebben axiale SpA. De niet-röntgenologische vorm komt 2 keer vaker voor bij vrouwen. De röntgenologische vorm komt twee keer vaker voor bij mannen.

Zie ook: <https://reumanederland.nl/reuma/vormen-van-reuma/axiale-spondyloartritis/> <sup>[2]</sup>

**Content blocks:**

Nuttige websites voor verdere informatie

**Tab:**

Axiale SpA

Lifestyle

Woordenlijst

**Accordion Type:**

Collapsible

---

**Source URL:** <https://www.novartis.nl/informatie-over-axiale-spa>

**Links**

[1] <https://www.novartis.nl/informatie-over-axiale-spa>

[2] <https://reumanederland.nl/reuma/vormen-van-reuma/axiale-spondyloartritis/>